



Ali so kanabinoidi primerni za zdravljenje/lajšanje slabosti pri odraslih bolnikih z rakom po zdravljenju s kemoterapijo?

Katarina Cotelj, dr. med., Polona Lampič, dr. med., Jerneja Skalja dr. med.

Mentorica: izr. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med., spec. druž. med.

Ali so kanabinoidi primerni za zdravljenje/lajšanje slabosti pri odraslih bolnikih z rakom po zdravljenju s kemoterapijo?

Katarina Cotelj, dr. med., Polona Lampič, dr. med., Jerneja Skalja dr. med.

Mentorica: izr. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med., spec. druž. med.

DA.

COCHRANE

- 23 RCT
- Primerjava: placebo / drugi antiemetiki
- Dronabinol je učinkovit



Pregledni članek

Cancer Management and Research

- Dronabinol je učinkovit
- “Rescue Drug“

KAKO V PRAKSI

2,5% peroralna raztopina dronabinola 10g,
peroralne kapljice

Rp/

dronabinol 0,25 g

kanabidiol 0,50 g

Miglyol ad 10,00

M.f. solutio

D.S. 3x1 gtt dnevno pol ure pred obrokom

Cannabinoids for nausea and vomiting in adults with cancer receiving chemotherapy

Lesley A Smith^{1,*}, Fredric Azariah², Verna TC Lavender³, Nicola S Stoner⁴, Silvana Bettiol⁵



Dronabinol for chemotherapy-induced nausea and vomiting unresponsive to antiemetics

May MB, Glode AE.

