


# Klinična pot prehranske podpore na primarnem nivoju

Milena Kovač Blaž

# Učni cilji

- Sposobnost da prepozname prehransko ogroženega pacienta
- Seznaniti se s terminologijo prehranskih motenj
- Sposobnost da uporabite MUST orodje za prehransko presejanje
- Zmožnost da se opredeli prehransko stanje na enostaven način in izvedejo osnovni prehranski ukrepi
- Seznati se s klinično potjo obravnavi prehranskih stanj na primarnem nivoju



PRISOTNOST/ODSOTNOST BOLEZNI: srčno-  
žilne, DM, rak, kognitivne motnje....

# Podhranjenost, jo prepoznamo?



# Kaj je problem?

- **PRIMER** iz prakse: 70-letna bolnica
- **DG:** GERB, Hiatalna hernia, stenoza požiralnika(na najožjem delu 2 mm), osteoporoza
- **Zaplet:** iatrogena perforacija po endoskopski dilataciji požiralnika
- **Th** Gastrostoma, navodila za ravnanje z gastrostomo ( do hranjevanje), po: pasirana hrana, postopno prehod na navadno hrano, OPD.
- **Prehranski pregled:** TT 36 kg ITM 14,6 kg/m<sup>2</sup>
- Običajna TT 50kg Izguba telesne teže po posegu - 13,6 kg
- **Lab:** crp 9, hg 108, feritin, AST, ALT., elektroliti, sečnina v mejah normale, T3 znižan
- **Ocena zmogljivosti.** Slabotna, večino dneva preleži, obstipirana, občasno bruhanje in tiščanje v trebuhu

# Prehransko stanje

- **Dobro prehransko stanje**=normalna sestava telesa, telo normalno deluje
- **Podhranjenost ( malnutrition)**= sestava telesa ni normalna, delovanje telesa je slabše:  
pod-hranjenost    pre-hranjenost

# Podhranjenost ali malnutricija

## „slaba prehranjenost“

Podhranjenost ali „slaba prehranjenost“ je vsako stanje, ko obstaja pomanjkanje, prebitek oziroma neravnovesje energije, beljakovin in drugih hranil, ki povzroči neželene učinke na obliko telesa (in tkiv), telesne funkcije in klinični izid.

# KLINIČNA PREHRANA

Preventiva, diagnostika in obravnavna prehranskih in presnovnih sprememb (motenj), ki so povezane z :

- Akutnimi boleznimi
- Kroničnimi boleznimi
- Stanji (motnjami), ki jih povzroča pomanjkanje ali prebitek energije in/ali posameznih hranil

**Vsak prehranski ukrep (preventivni ali kurativni), ki se ukvarja s posameznikom/pacientom je ukrep klinične prehrane!**

# Prehrana v medicini

Za uspešno reševanje prehranskih izzivov med boleznijo, poškodbami ali rehabilitacijo ter v skrbi za specifične populacijske skupine

je bistvenega pomena

- **uporaba strokovnega jezika & standardizirane**
- **Terminologije**

ki temelji na znanstvenih dokazih in je splošno sprejeta v strokovni skupnosti

## ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition

T. Cederholm *a*, <sup>\*</sup>R. Barazzoni *b*, P. Austin *c*, *y*, P. Ballmer *d*, G. Biolo *e*, S.C. Bischoff *f*, C. Compher *g*, *1*, I. Correia *h*, *1*, T. Higashiguchi *i*, *1*, M. Holst *j*, G.L. Jensen *k*, *1*, A. Malone *l*, *1*, M. Muscaritoli *m*, I. Nyulasi *n*, *1*, M. Pirlisch *o*, E. Rothenberg *p*, K. Schindler *q*, S.M. Schneider *r*, M.A.E. de van der Schueren *s*, *z*, C. Sieber *t*, L. Valentini *u*, J.C. Yu *v*, *1*, A. Van Gossum *w*, P. Singer

- *Clinical Nutrition* 36 (2017) 49-64

➤ *Standardizacija prehranske terminologije*

# MOTNJE PREHRANJENOSTI

## Motnje prehranjenosti

- Podhranjenost/ nedohranjenost
- Prekomerna telesna masa
- Debelost
- Motnje mikrohranil (elektroliti, elementi v sledovih)
- Re-feeding sindrom

## S prehranjenostjo povezane motnje


- Krhkost
- Sarkopenija

•

Espen, terminologija 2016

# Diagona podhranjenosti

## PRESEJANJE NA PREHRANSKO OGROŽENOST



## Razsežnost podhranjenosti v Evropi

- Več kot 33milj Evropejcev \*
- več kot 3 milj Britancev tvega podhranjenost, med njimi, jih največji delež (93%) živi v splošni populaciji.

\*Ljunquist O, van Gossum A, de man F. The European fight against malnutrition. Clin Nutr

# Prevalenca podhranjenosti

- Ambulantni bolniki 1-15%
- Bolniki v zavodih 25-60%
- Hospitalizirani 35-65%

*Omran et al, Nutrition 2000*

- Prisotnost podhranjenosti je odvisna od tega kako jo opredelimo!

# Podhranjenost – ali jo prepoznamo?

## Hospitalizirani bolniki

✓ 62-70% primerov je malnutričija neprepoznana  
(Kelly et al, 2000, Mowe et al 1991)

## Ambulantni bolniki

✓ 45-100% primerov je malnutričija neprepoznana  
(Miller et al 1990)

## DSO

Skoraj 100% neprepoznana (26 DSO)  
(Abbas & Rudman 1990)

## Splošna populacija

15-50% otrok s slabim uspevanjem – neprepoznani kot taki  
(Wright et al 1998; Bachelor 1990)

## Objavljene nacionalne raziskave

**Ustanove- BOLNIŠNIČNA ( vsi oddelki ) 28%**

### Glede na primarno diagnostično skupino

**Bolezni prebavil 42 %**

**Bolezni dihal 38 %**

**Crigler-Najjarov sindrom 32 %**

**Ginekološke, urološke/ledvične bolezni  
24 %**

**Mišično-skeletne bolezni 21 %**

**Srčno-žilni sistem 20 %**

**Onklološke bolezni 40%**

# Razsežnost podhranjenosti

- 33 milj Evropejcev je ogroženih zaradi podhranjenosti.\*
  - Več kot polovica Evropejcev je prekomerno težkih ali debelih\*\*
  - **Podhranjenost je v 90% neprepoznana!!!**
- 
- **Podatki za Slovenijo.**
  - Podatki CPC+ **Ocena tveganja za podhranjenost-MUST**

\*Ljunquist O, van Gossum A, de man F. The European fight against malnutrition. Clin Nutr 2010; 29:149-50

\*

\*\*Overweight and obesity - BMI statistics 2013, available in 2011 at <http://epp.eurostat.ec.europa>

## **Skupine izpostavljene tveganju za podhranjenost**

- **kronične bolezni**

kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), rak, vnetna črevesna bolezen, gastrointestinalne bolezni, ledvične ali jetrne bolezni

- **napredujoče kronične bolezni**

demenca, nevrološke bolezni (Parkinsonova bolezen, bolezni motoričnih nevronov)

- **akutna obolenja**

kadar bolnik več kot 5 dni ni zaužil nobene hrane (to je pogosto pri akutnih obolenjih in redko v lokalni skupnosti)

- **krhkost**

slabotnost, nepokretnost, starost, depresija, nedavni odpust iz bolnišnice

- **socialne težave**

slabo socialno okolje, omejenost na dom, nezmožnost kuhati in nakupovati, revščina

## **Vzroki za podhranjenost**

- ✓ **Nezadosten vnos hrani** (hranilno in energetsko) slab apetit, motnje okusa, slabost, dysfagia, depresija, nezmožnost priprave hrane ali hranjenja... neprimerna priprava hrane
- **Pomanjkljiv izkoristek hrane** (okvarjena presnova in absorpcija hrani) motnje delovanja želodca, črevesja, pankreasa, jeter)
- ✓ **Povečana potreba** (katabolizem kroničnih stanj) vnetje, rak rane, opeklne, poškodbe

# Podhranjenost - funkcionalne in klinične posledice

- Zdravi moški, 24 tednov delnega stradanja:
- izguba 25% začetne mase  
(30% začetne maščobe in  
82% puste mišične mase)
- Keys et al..  
Minnesota Starvation Experiment

Pusta telesna masa (%izgube)	Komplikacije	Pridružena mortaliteta (%)
10	Motena imunost,povečan riziko infekta	10
20	Upočasnjeno celjenje ran. Šibkost, infekti	30
30	Prešibek za sedenje, preležanine, rane se ne celijo	50
40	Smrt,ponavadi pljučnica	100

# Vpliv podhranjenosti na organske sisteme

- **Kognitivne funkcije**
  - (anksioznost, depresija – PEM, pomanjkanje vitaminov)
- **Skeletna mišičnina**
  - zmanjšanje mišične moči
- **Delovanje srčnožilnega sistema in ledvic:**
  - izguba srčne mišice (proporcionalno izgubi TT), <CO, bradikardija, hipotenzija, aritmije
  - <RBF, GF – povečanje ECV – edemi pri stradanju
- **Ventilacija**
  - neučinkovitost kontrakcije dihalnih mišic, težaven weaning
- **GIT**
  - motnja absorbcije
  - večja možnost MOF pri hudo podhranjenih
- **Termoregulacija**
  - izguba TT onemogoči termogenezo ob mrazu;
  - stradanje oslabi vazokonstriktorni odziv
- **Imunski sistem**
  - Zavrta nespecifična imunost, motnje delovanja komplementa
  - Motena celično posredovana imunost
  - Motena humorala imunost zaradi motene sinteze Ig
  - Pomanjkanje učinkov IL1 - manjša stopnja proliferacije LY
- **Celjenje ran - upočasnjeno**

- Prehranska pomanjkanja in podhranjenost sta pomemben problem v klinični praksi!

## Posledice podhranjenosti

### Podhranjeni bolniki imajo:

- Več zapletov zdravljenja, večjo mortaliteto
- Več sprejemov (in ponovnih sprejemov) v bolnišnico, daljše obdobje bolnišnične oskrbe,
- Večje potrebe po zdravstveni oskrbi (več obiskov osebnega zdravnika in patronažne oskrbe, več antibiotikov).

Stroški zdravstvene oskrbe podhranjenih posameznikov so več kot dvakrat večji, kot stroški zdravstvene oskrbe normalno prehranjenih posameznikov.

Stratman, Disease related malnutrition..2003

# Podhranjenost negativno vpliva na kvaliteto življenja

- Višja stopnja ponovnih sprejemov v bolnišnico, daljša hospitalizacija (*Correja et al. 2003, Pressoir et al., 2010*)
- Povečan negativni vpliv težav, ki jih bolniki imajo (*Sarna et al., 1994*)
- Zmanjšana kvaliteta življenja  
(*Andreyev et al. 1998, O'Gorman et al. 1998, Ollenschlager et al., 1992, Ovesen et al., 1993, Persson et al., 2002, Nourissat 2008*)
- Zmanjšana mišična moč in slabše funkcionalno stanje (*Norman et al 2010*)

# *Podhranjenost: Etiologija, posledica in pregled rizičnega bolnika*

C Alberda, A Graf, L McCargar

Best Practice & Research Clinical Gastroenterology


2006, Pages 419-439

*Nutritional and Dietary Consequences of Gastrointestinal Diseases*

Podhranjenost je posledica neravnovesja hrani in energije,  
ki jo zagotavljamo telesu (**PREMALO**), glede na njegove potrebe (**PREVELIKE**)

*Te potrebe dramatično narastejo in se spremenijo pri boleznih.*

If energy is not available  
the body eats itself or  
(is fed from inside)




# PODHRANJENOST

Prva pomoč  
Telo si pomaga samo!

Glukoneogeneza je pri stresni presnovi povečana!!!!  
Vir substratov: alanin iz proteinolize, glicerol iz lipolize in laktat iz anaerobne glikolize

## Prva pomoč



# Stradanje v stanju presnovnega stresa nas razgradi!

Stradanje	bolnik	zdrav
Telesna teža	- / ↓	↓
Masa telesnih celic (pusta telesna masa, predvsem mišice)	↓↓↓	↓
Telesno maščevje	↓↓	↓↓↓
Vnos kalorij	↓↓↓	↓↓↓
Retenca tekočine in soli	↑↑	?
Bazalna poraba energije	↑ / ↓	↓↓↓
Sinteza proteinov	↑↑↑	↓↓↓
Razgradnja proteinov	↑↑↑	↓↓↓
Proteolysis-Inducing Factor (PIF)	↑	-

Adapted from Kotler DP. 2000. *Ann Intern Med.* 133:622

# Zapleti podhranjenosti glede na izgubo puste telesne mase


Pusta telesna masa (%izgube)	zapleti	Pridružena umrljivost (%)
10	Motena imunost, povečano tveganje okužbe	10
20	Upočasnjeno celjenje ran, šibkost, okužbe	30
30	Prešibak za sedenje, preležanine, slabo celjenje ran	50
40	Smrt, pljučnica	100

# PREHRANSKE diagnoze - ESPEN 2016

- **Podhranjenost:**
- **Bolezenska podhranjenost:**
  - Vnetna bolezenska podhranjenost:
    - Akutna vnetna bolezenska podhranjenost
    - Konična vnetna bolezenska podhranjenost – kahektična podhranjenost (kaheksija)
    - Ne-vnetna bolezenska podhranjenost - ne-kahektična podhranjenost
  - **Ne-bolezenska podhranjenost:**
    - Gladovna podhranjenost (marazmus, kvašiorkor)
    - Socio-ekonomsko ali psihološko vezana podhranjenost
  - **Prehranjenost – prekomerna masa in debelost** ( sarkopenična, centralna debelost )
  - **Motnje mikrohranil**
  - **Pomanjkanje mikrohranil**
  - **Presežek mikrohranil**
  - **Sindrom ponovnega hranjenja – refeeding sindrom**
  -

# Diagona podhranjenosti

## PRESEJANJE NA PREHRANSKO OGROŽENOST



# Opredelitev podhranjenosti

## ESPEN

1. Prehranska ogroženost
2. ITM < 18,5  
ali  
2. Izguba 10% BM v 6m  
+ ITM < 20 do 70 let (< 22, 70 ali  
več let)  
ali  
FFMI < 15 Ž, < 17 M

## ASPEN

1. Nizek energijski vnos
2. Izguba TM
3. Izguba MM
4. Izguba subkutanega  
maščevja
5. Akumulacija tekočine
6. Znižana moč stiska roke

# PODHRANJENOST- NEDOHRANJENOST, ESPEN 2016

- **ITM <18.5 ali**
- **Kombinacija dejavnikov**
- **Nenamerna izguba telesne mase (obvezno)**

*Izguba telesne mase je lahko >10% nedavne običajne telesne mase , ali >5% v 3 mesecih.*

- **in vsaj 1 dejavnik:**

## **1. Zmanjšan ITM**


*(ITM <20 pri mlajših kot 70 let ali <22 kg/m<sup>2</sup> pri starejših kot 70 let.*

## **2. Nizek indeks nemaščobne mase (fat free mass indeks -FFMI).**

*FFMI <15 pri ženskah, <17 kg/m<sup>2</sup> pri moških*

Cederholm T, et al.,

GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. A consensus report from the global clinical nutrition community, Clinical Nutrition (2018), <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.08.002>



# 1 Fenotipski + 1 etiološki kriterij

Phenotypic and etiologic criteria for the diagnosis of malnutrition.

Phenotypic Criteria <sup>g</sup>		Etiologic Criteria <sup>g</sup>		
Weight loss (%)	Low body mass index (kg/m <sup>2</sup> )	Reduced muscle mass <sup>a</sup>	Reduced food intake or assimilation <sup>b,c</sup>	Inflammation <sup>d,e,f</sup>
>5% within past 6 months, or >10% beyond 6 months	<20 if < 70 years, or <22 if >70 years  Asia:  <18.5 if < 70 years, or <20 if >70 years	Reduced by validated body composition measuring techniques <sup>e,f</sup>	≤50% of ER > 1 week, or any reduction for >2 weeks, or any chronic GI condition that adversely impacts food assimilation or absorption <sup>b,c</sup>	Acute disease/injury <sup>d,f</sup> or chronic disease-related <sup>e,f</sup>

# **PODHRANJENOST, KAHEKSIJA**

Kompleksni presnovni sy pridružen kroničnim boleznim ( rak, KOPB, srčno popuščanje...)

Izguba mišične mase, z ali brez izgube maščobne mase  
sistemske vnetje - **Zmerno vnetje !!!!**

**PREPREČUJEMO PODHRANJENOST BOLNIKOV, KI  
MOČNO POSPEŠI KAHEKTIČNE PROCESE IN  
POSLABŠA KVALITETO ŽIVLJENJA.**

# Kaheksija

Splošna opredelitev  
Washington 2008

## osnovni kriterij

- prisotnost kronične bolezni
- izguba vsaj 5% telesne mase 12 mesecih

## 3 od 5 dodatnih kriterijev

- zmanjšana mišična moč (meritev v najnižji tercili),
- utrujenost,
- anoreksija,
- nizek indeks puste telesne mase,
- patološki izvidi biokemičnih preiskav:
  - zvišanje vnetnih kazalcev : CRP>5,0 mg/L, IL-6>4,0 pg/mL,
  - anemija - Hemoglobin<120g/L,
  - hipoalbuminemija - Albumini<32g/L)

# Kaheksija in presnovne spremembe

## PREKAHEKSIJA

- izguba telesne mase  $\leq 5\%$
- anoreksija in presnovne spremembe

## KAHEKSIJA

- izguba telesne mase  $> 5\%$  ali
- ITM  $< 20$  in izguba telesne mase  $> 2\%$  ali
- sarkopenija in izguba telesne mase  $> 2\%$
- znižan vnos hrani, prisotno sistemsko vnetje


## REFRAKTARNA KAHEKSIJA

- močno izražen telesni propad
- osnovna bolezni močno prokatabolna
- slaba telesna zmogljivost
- ni več odziva na zdravljenje
- pričakovano preživetje  $< 3$  mesece

# Ključna sporočila


- Ljudje smo dobro prilagojeni na dolgotrajno enostavno stradanje tako da uporabljamо svoje zaloge sladkorjev, proteinov in maščob;
- Zmanjšanje bazalne porabe energije in ohranjanje telesnih proteinskih rezerv sta nadaljna odziva na stradanje. Energetske zaloge se zapolnijo v fazi popolnjevanja zalog po stradanju.;
- Dolgotrajno enostavno ali popolno stradanje vodi do marasmične oblike podhranjenosti;
- Kadar je prisoten stresni odziv sta pospešena katabolizem in telesno propadanje in normalen odziv na stradanje ni možen;
- Izguba telesne teže v obeh stanjih povzroča upada psihični in fizičnih funkcij ter vodi do slabšega izhoda bolezenskih stanj.

# Epidemija debelosti- globalni zdravstveni problem



# Trends in Global Obesity


Changes in & adult obesity prevalence over time in selected countries around the Globe



[http://www.worldobesity.org/.](http://www.worldobesity.org/)

The Pre-graduate LLL Programme in Clinical Nutrition ESPEN Copyright 2017

## PREKOMERNO PREHRANJENI IN DEBELI



Note: population aged 18 and over.




**ITM = 30,16    ITM = 30,16**

## Zakaj je pomembna ocena sestave telesa?

- Skupna masa in delež puste in maščobne mase, ki so znotraj ugotovljenih mej preprečujejo številne zdravstvene probleme, ki so povezani z pretiranim ali prenizkim deležem telesnega maščevja.
- *Teža maščevja in teža (količina) pustih tkiv, NE skupna teža določajo zdravstveno tveganje (debelost, sarkopenija).*

# Typical Body Composition



## **Ugotavljanje debelosti**

- Po priporočilih WHO se zaradi enostavnosti uporablja **ITM kg/m<sup>2</sup>** indikator prehranjenosti Pozor!! Ne upošteva telesne strukture, optimalen ITM se razlikuje med bolnimi in zdravimi, optimalen ITM se s starostjo spreminja)

Obseg pasu > 94 -102 cm pri moških

> 80 -88 cm pri ženskah

- Ocena telesne sestave ( delež puste telesne mase, delež maščevja, voda)

16-25% ženske


12-18% moški

- ITM ne razlikuje med

MHO metabolično zdravi debeli (ugoden metabolični profil)

MONW metabolično nezdrave osebe s normalno telesno maso  
(večji odstotek maščevja, nižja pusta telesna masa, višji nivo holesterola)


# Klinični pomen podhranjenosti



## The ‘Obesity Paradox:’ a parsimonious explanation for relations among obesity, mortality rate, and aging?


Douglas K. Childers, PhD<sup>a</sup> and David B. Allison, PhD<sup>a,b</sup>

### Splošna populacija



**Figure 1.**  
(Mortality Rates) The total mortality rate given  $BMI = b$  and age  $t = 20$  (red), 30 (green), 40 (yellow), 50 (purple), 60 (magenta), and 70 (blue).

### Bolniki




**Figure 8.**  
The mortality rate given  $C=1$ ,  $BMI = b$  and age  $t = 20$  (red), 30 (green), 40 (yellow), 50 (purple), 60 (magenta), and 70 (blue).

# Paradoks debelosti – inverzna epidemiologija

2

Soeters PB, Sobotka L, The pathophysiology underlying the obesity paradox, Nutrition (2011)



# Patofiziološko ozadje paradoksa debelosti (inverzne epidemiologije)

- Mišična masa je pomembna determinanta zdravja/  
prehranskega stanja
- Starost, sarkopenija,  
kaheksija      mm

*Casas-Vara, Nutrition 2012,*


*Gastelurrutia, Am J Cardiol 2011*

- najbolj debeli bolniki z KSP imajo najboljše  
prehransko stanje !




# S PREHRANO POVEZANE MOTNJE

- **Sarkopenija**



- **Krhkost**
- ( stanje ranljivosti in zmanjšane odpornosti)



Opinion Paper

Consensus definition of sarcopenia, cachexia and pre-cachexia:

Joint document

elaborated by Special Interest Groups (SIG) "cachexia-anorexia in chronic wasting diseases" and "nutrition in geriatrics"

M. Muscaritoli <sup>a,n</sup>, S.D. Anker <sup>b,n</sup>, J. Argilé <sup>s,c,n</sup>, Z. Aversa <sup>a,n</sup>, J.M. Bauer <sup>d,o</sup>,

Bioletti <sup>e,n</sup>, Y. Boirie <sup>f,o</sup>,

I. Bosaeus <sup>g,o</sup>, T. Cederholm <sup>h,o</sup>, P. Costelli <sup>i,n</sup>, K.C. Fearon <sup>j,n</sup>, A. Laviano <sup>k,n</sup>,

Maggio <sup>k,o</sup>,

F. Rossi Fanelli <sup>a,n</sup>, S.M. Schneider <sup>l,o</sup>, A. Schols <sup>m,n</sup>, C.C. Sieber <sup>d,o</sup>

<sup>a</sup> Department of Clinical Medicine, "La Sapienza", University of Rome, Viale dell'Università, 37, Rome 00185, Italy

<sup>b</sup> Department of Cardiology, Charité Medical School, Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Germany

<sup>c</sup> Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain

<sup>d</sup> Department of Geriatric Medicine, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany

<sup>e</sup> Department of Medical, Technological and Translational Sciences, Division of Internal Medicine, Molecular Medicine, AOUI, Trieste, Italy

<sup>f</sup> INRA, Centre Clermont-Ferrand-Theix, UMR 1019, Unité de Nutrition Humaine, CRNH Auvergne, Clermont-Ferrand, France

<sup>g</sup> Department of Clinical Nutrition, Sahlgrenska University Hospital, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Göteborg, Sweden

<sup>h</sup> Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden

<sup>i</sup> Department of Experimental Medicine and Oncology, University of Turin, Turin, Italy

<sup>j</sup> Clinical and Surgical Sciences (Surgery), The Royal Infirmary of Edinburgh, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland, UK

<sup>k</sup> Department of Internal Medicine and Biomedical Sciences, Section of Geriatrics, University of Parma, Parma, Italy

<sup>l</sup> Gastroenterologie et Nutrition Clinique, INSERM U907, Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice, France


<sup>m</sup> Department of Respiratory Medicine, University of Maastricht, Maastricht, The Netherlands

(2010) 154–159

- anoreksija zaradi staranja, zmanjši vnos hrane,
- hormonske spremembe v povezavi s staranjem (zmanjšana sinteza rastnega in spolnih hormonov, resistenca na leptin, insulin in ščitnične hormone),
- nevrodegenerativni procesi,
- telesna (ne)aktivnost,
- vnos beljakovin in energije,
- status vitamina D.




# Sarkopenija



- 0,4 – 0,8 kg /10 let
  - po 50 letu menopavza
  - Staranje( do 90.leta 50% zmanjšanje mm)
  - bolezni
- 
- *Mišična masa je banka za presnovne potrebe in imunski sistem!*
  - *Mirovanje (telesna aktivnost, aminokisline)*

Age-related changes in muscle mass in thigh cross-sectional area of two people with similar BMI

# Stresna presnova



# Sarkopenična debelost

- Nizek FFMI, visok FMI

## Presnovne značilnosti sarkopenije

- Intramuskularna akumulacija maščob
- Motnje funkcije mitohondrijev
- Insulinska resistenca

*Presnovne posebnosti debelosti in sarkopenije  
so istosmerne*

*Bedrest in sarcopenia, Cooker, Wolfe curr Opin in Clin Nutr and  
Met Care, 2012*



## **SARKOPENIJA**

**POSKUŠAMO ČIM DLJE OHRANJATI  
FUNKCIONALNO (MIŠIČNO) MASO IN S  
TEM BOLNIKOVO KONDICIJO IN  
KVALITETO ŽIVLJENJA.**

# Mišična moč

- Je dober napovedni dejavnik:
  - **V KRONIČNIH STANJIH:**
    - staranje
    - Odpoved organov(LI, KOPB,  
**Srčno popuščanje....**
  - **V AKUTNIH STANJIH:**
    - Operativni posegi, poškodbe
    - **Second hit (superinfekcije pri že kritičnih stanjih)**

# Funkcija

- Mišična moč




- Mobilnost



CS

# Mišična moč



# Debelost – splošna dejstva

- Kronicna vnetna bolezen z pretirano akumulacijo telesnega maščevja
- Bolezen !!!
- Neodvisen rizični dejavnik za številne bolezni



# Maščevje predstavlja največji endokrini organ




Fig. 1. Adipocytes as an endocrine cell

# Presnovne spremembe pri debelosti

**DEBELOST JE povezana s številnimi  
kroničnimi boleznimi in presnovnimi motnjami**


- hiperinsulinemija,
  - insulinska rezistenca,
  - hiperglikemija,
  - spremenjena presnova nekaterih hormonov.
- **značilne presnovne motnje pri kroničnih katabolnih stanjih, ki povzročajo razvoj kaheksije**



Inui A, Meguid MM.

# Cachexia and obesity: two sides of one coin?

*Curr Opin Clin Nutr Metab Care.* 2003 Jul;6(4):395-399.



# **Smernice za obravnavo debelosti**


- 2016 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults, NICE
- **PERSONALIZIRANA OBRAVANAVA**
- **Temelji na:** oceni motiviranosti za spremembo
  - zmerni omejitvi dnevnega kaloričnega vnosa
  - povečani telesni dejavnosti
  - uporabi vedenjsko kognitivnih tehnik,( samokontrola vedenja), čuječnost, dobra samopodoba
  - ureditev spanja
  -
- Začetnemu programu naj sledi čim daljši vzdrževalni program ali spremljanje udeležencev!
-

Overweight or Obesity	BMI ≥25 (≥23 in certain ethnicities)	Metabolic syndrome	10%	Prevention of T2DM	
		Prediabetes	10%	Prevention of T2DM	
		T2DM	5% to ≥15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduction in A1C</li> <li>Reduction in number and/or doses of glucose lowering medications</li> <li>Diabetes remission especially when diabetes duration is short</li> </ul>	
		Dyslipidemia	5% to ≥15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lower triglycerides</li> <li>Raise HDL-c</li> <li>Lower non-HDL-c</li> </ul>	
		Hypertension	5% to ≥15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lower systolic and diastolic BP</li> <li>Reductions in number and/or doses of antihypertensive medications</li> </ul>	
		Nonalcoholic fatty liver disease	Steatosis	5% or more	Reduction in intrahepatocellular lipid
		Steatohepatitis		10% to 40%	Reduction in inflammation and fibrosis
		Polycystic ovary syndrome		5% to 15% or more	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ovulation</li> <li>Regularization of menses</li> <li>Reduced hirsutism</li> <li>Enhanced insulin sensitivity</li> <li>Reduced serum androgen levels</li> </ul>
		Female infertility		10% or more	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ovulation</li> <li>Pregnancy and live birth</li> </ul>
		Male hypogonadism		5% to 10% or more	Increase in serum testosterone
		Obstructive sleep apnea		7% to 11% or more	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improved symptomatology</li> <li>Decreased apnea-hypopnea index</li> </ul>
		Asthma/reactive airway disease		7% to 8% or more	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improvement in forced expiratory volume at 1 second</li> <li>Improved symptomatology</li> </ul>
		Osteoarthritis		<ul style="list-style-type: none"> <li>≥10%</li> <li>5% to 10% or more when coupled with exercise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improvement in symptomatology</li> <li>Increased function</li> </ul>
		Urinary stress incontinence		5% to 10% or more	Reduced frequency of incontinence episodes
		Gastroesophageal reflux disease		10% or more	Reduced symptom frequency and severity
		Depression		Uncertain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduction in depression symptomatology</li> <li>Improvement in depression scores</li> </ul>


Abbreviations: A1C = hemoglobin A1c; BMI = body mass index; BP = blood pressure; HDL-c = high-density lipoprotein cholesterol; T2DM = type 2 diabetes mellitus.

# KAJ JE PROBLEM NAMERNEGA HUJSANJA?





## Spremembe telesne sestave, kot rezultat ponavljanjajočih hujšanj




© 2005 Wadsworth - Thomson

# Kako se lotimo prehranske obravnave?



## Obravnava podhranjenosti?

- Javno zdravstveni pristop
- Sarkopenična debelost?



- Personalizirana prehranska obravnava

(proces klinične prehranske obravnave)

*Cederholm et al. ESPEN guidelines...*




# PROCES PREHRANSKE OBRAVNAVE

- Presejanje na prehransko ogroženost  
(podhranjenost, prekaheksijo, sarkopenij >65let)
- Prehranska obravnavna
- Diagnostični procesi
- Plan prehranske strategije
- Prehranska oskrba/Prehranska terapija
- Monitoring, preverjanje učinkovitosti
- Prilagajanje terapije

# Diagram poteka klinične poti

## 1. Algoritem 1 (primarni nivo: RA, ZVC)



## 3. Algoritem 3 (sekundarni, terciarni nivo: bolnišnice)

1. Bolniki, ki potrebujejo sekundarni nivo prehranske obravnave
2. Hospitalizirani bolniki

Prehranski dnevnik, sestava telesa, laboratorij

## 2. Algoritem 2 (primarni nivo, obravnavava debelosti v RA)

# Kako prepoznati podhranjenost med populacijo na primarnem nivoju?

- **Obisk pri zdravniku**
- **Referenčna sestra:** Preventivni pregledi  
Aktivno presejanje na DT in KNB ( uporaba validranih vprašalnikov) , KVB, AH, DM2, COPD, astma, depresija, osteoporoz, BHP)  
Vodenje urejenih kroničnih bolnikov (protokoli)
- **Patronažna sestra**

## NADGRADNJA

### AKTIVNO PRESEJANJE IN PREHRANSKA OBRAVNAVA

( presejalno orodje MUST)

# Klinični dietetik na primarnem nivoju zdravstvenega varstva



- Sodelovanje z zdravnikom ( dg podhranjenosti)
- Prehranska obravnava
- Povezava z sekundarnim in terciarnim zdravstvenim sistemom)

# Prehransko presejanje bolnikov

**Je orodje!**

**Hitro in enostavno prepoznamo bolnike ki so  
prehransko ogroženi**

# Orodja

- Nutritional Risk Index<sup>1</sup>
- Subjective global assessment<sup>2</sup>
- Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)<sup>3</sup>
- Nutritional Risk Screening (NRS 2002)<sup>4</sup>
- MNA (starejši)<sup>5</sup>



1 Veterans Affairs, New Engl J Med 1991

2 Detsky et al, JPEN, 1984

3 BAPEN

4 Kondrup et al, Clin Nutr 2003

5 Vellas et al, Nutrition 1999

# MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)– lastnosti

- **Omogoči določiti stopnjo prehranske ogroženosti (NIZKO, ZMERNO, VISOKO).**
- **5 – fazno (5 korakov) presejalno orodje.**
- **Vključuje priporočila za prehransko obravnavo** in alternativne ukrepe v primerih, ko indeksa telesne mase (ITM) ni mogoče pridobiti z meritvami telesne višine in teže.
- **Enostavno in hitro izvedljivo.**

# Osnovni koraki MUST-a

## 1.-KORAK – ITM (kg/m<sup>2</sup>)

Kakšna je pacientova trenutna telesna masa?

Kako visok je pacient?

## 2.-KORAK – DELEŽ IZGUBE TELESNE MASE

Kakšna je bila telesna masa v zadnjih 3/6 mesecih (spremembe v TM)?

## 3.-KORAK – VPLIV AKUTNEGA OBOLENJA

Kakšno je aktualno zdravstveno stanje posameznika (ali je akutno bolan).

Ali je uživanje hrane zadostno (ne bo ali ni že 5 dni zaužil nobene hrane).

## 4.-KORAK – SPLOŠNO TVEGANJE ZA PODHRANJENOST

## 5.-KORAK – SMERNICE ZA PREHRANSKE UKREPE

# Korak 1 + Korak 2 + Korak 3

ITM ( $\text{kg}/\text{m}^2$ )

<u>ITM (<math>\text{kg}/\text{m}^2</math>)</u>	<u>Točke</u>
>20	= 0
18,5 – 20	= 1
<18,5	= 2

Delež izgube telesne teže

Nenačrtovana izguba telesne mase v zadnjih 3 – 6 mesecih

<u>%</u>	<u>Točke</u>
<5	= 0
5–10	= 1
>10	= 2

Vpliv akutnega obolenja (navadno se ne pojavlja izven bolnišnic)

Če je bolnik zbolel za akutno boleznijo in verjetno ne bo ali že 5 dni ni zaužil hrane

Točke  
= 2

## Korak 4

Splošno tveganje podhranjenosti

Skupni seštevek koraka 1–3

Tveganje	Seštevek
Nizko	= 0
Srednje	= 1
Visoko	= 2 in več

# Korak 5

## Smernice



### 0 Nizko tveganje

#### Rutinska klinična obravnava

Pregled in ponovno presejanje (mesečno v domovih za starejše občane in letno v opredeljeni populaciji zdravnika ).

Če je ITM > 30 kg/m<sup>2</sup> (debelost), prehranska priporočila v skladu z modelom za obravnavo debelosti \*\*\*



### 1 Srednje tveganje

#### Opazovanje

Prehranski nasveti za optimalni prehranski vnos .

Beleženje vnosa hrane tekom 3 dni\*, spodbujanje uživanja večih manjših obrokov in prigrizkov z visoko hranilno vrednostjo ter hrano in pičajo z visoko vrednostjo beljakovin .

Na voljo so prehranski dodatki hranil v prahu (posamezna hranila ) za dodajanje vodi ali mleku.

Pregled napredka/ponovno presejanje po 1–3 mesecih , glede na klinično stanje ali prej , če stanje to zahteva \*\*.

V primeru izboljšanja , nadaljevanje prehranske intervencije , da dosežemo „nizko tveganje“ .

V primeru poslabšanja , obravnavamo kot „visoko tveganje“ .



### 2 in več točk Visoko tveganje

#### Zdravljenje

Prehransko svetovanje z napotki za optimalen prehranski vnos . Beleženje vnosa hrane (3 dni)\*, spodbujanje uživanja več manjših obrokov in prigrizkov z visoko hranilno vrednostjo ter hrano in pičajo z visoko vrednostjo beljakovin .

Predpis OPD in spremljanje stanja : upoštevajoč MUST za ustrezno uporabo OPD .

V primeru izboljšanja , nadaljevanje , da dosežemo „srednje tveganje“ .

Pregled napredka /ponovno presejanje po 4–6 tednih glede na klinično stanje ali prej , če stanje to zahteva \*\*.

V primeru, da se stanje ne izboljša in je potrebna specialistična pomoč , pacienta napotimo k dietetiku .

\* V primeru, da 3 – dnevnega opazovanja prehranskega vnosa ni možno izvesti , izvedemo 24 urno opazovanje .

\*\* Po presoji zdravnika, napotitev k dietetiku .

\*\*\* Glej model za obravnavo debelosti .

# Kako pristopimo k obravnavi?

S pomočjo tima usposobljenih strokovnjakov  
(zdravnik, dipl. med. sestra, dietetik, fizioterapeut,  
kineziolog)

**Osrednja vloga bolnika** (zdravstvena stanja in  
psihosocialne lastnosti)

**Zdravnik opredeli:** diagnozo presnovne motnje, vzrok,  
predlaga terapevtski ukrep, spremlja zdravstveno stanje  
bolnika in po potrebi ukrepe prilagaja.

Diagnostic and procedure related terminology of clinical nutrition-an ESPEN consensus guideline

# PREHRANSKI PREGLED

- Sledi prehranskem presejanju
- Prehranska anamneza
- antropometrični kazalci
- ocena funkc stanja ( dinamometer)
- Telesna sestava
- Lab. vrednosti ( hg, crp, serumski alb)
- Sledi določitev prehranske diagnoze in prehranskega načrta
- (zdravnik skupaj z dietetikom)

## Obravnavo bolnika - srednje tveganje za podhranjenost, **MUST 1**

- **DMS ali klinični dietetik:** Ocena prehranskega stanja (ustreznost prehrane)
- Klinični pregled, meritev TM, ITM, BIA, funkcijski testi, ocena stanja zmogljivosti,
- Lab ( crp, hg, dks, albumini.... biokemične preiskave, krvni sladkor, elektroliti, magnezij, fosfat, kalcij, jetrni testi, holesterol, trigliceridi, TSH) pa so pomembne za opredelitev splošnega stanja bolnika in spremjanja odziva na prehransko terapijo.
- Prehranska dg in dg podhranjenosti, cilji, prehranski ukrepi.....
- Sledenje, kontrola čez 1 do 3 mesece.

## Visoko tveganje za podhranjenost, **MUST 2 in več**

- **Klinični dietetik:** Prehranski pregled ( ocena prehranskega stanja, meritvijo bolnikove telesne sestave, telesnim pregledom, oceno funkcije in zmogljivosti).
- Kvalitativna ocena prehrane (ocena skladnosti vzorca bolnikove prehrane s priporočili) in kvantitativna ocena prehrane (ocena hrnilno-energijskega ravnotežja, z uporabo različnih informacijskih programskih orodij).
- Klinični dietetik zdravniku predstavi ugotovitve o bolniku (prehransko/ presnovno diagnozo), ugotovitve o bolniku in prehranski načrt (prehransko terapijo) ter za bolnika najustreznejši OPD. V timu se dokončno sprejme odločitev o za bolnika!
- Kontrola 3- 4 tedne, pp prej, v primeru poslabšanja po 4 .6 tedne - specialist

**PRIPOROČILA**

**PREHRANSKA OBRAVNAVA**

**PRI IZVAJANJU PREHRANSKE PODPORE UPOŠTEVAMO  
OSNOVNA PRIPOROČILA ZA PREHRANO KRONIČNIH BOLNIKOV**

# *Multimodalna terapija*

- **Prehranska podpora**
- Telesna vadba
- Farmakološka terapija: protivnetna, antikatabolna
- Zdravljenje je najbolj uspešno v zgodnjem stadiju: prekaheksija!
- V stanju refraktarne kaheksije v ospredju ukrepi za kontrolo simptomov.

# Prehransko svetovanje

## - pristop „najprej hrana“

- Prva izbira za paciente z nizkim in srednjim tveganjem.
- Vključimo paciente svojce, bližnje.
- Glede na individualne potrebe/individualni prehranski načrt:
  - Usmerjeno v zadostno uživanje dnevnih obrokov, ki vsebujejo dovolj beljakovin in energije.
  - Usmerjeno v uživanje uravnotežene prehrane.
  - Usmerjeno v zadostno uživanje tekočine.
  - Usmerjeno v primerno gibanje.
  - Usmerjeno v pravilni pripravi hrane (higiena in tehnike priprave prehrane različne gostote).
  - Usmerjeno v energijsko in hranilno bogatenje dnevnih obrokov.
  - Usmeritve pri prehrani po sondi.

# Prehranski nasveti za izboljšanje običajnega prehranjevanja

- **Za povečanje energijskega in beljakovinskega vnosa :**
- običajno prehrano obogatimo z živili z večjo energijsko in beljakovinsko gostoto - npr. sir, polnomastno mleko, maslo, smetana, sladkor, med, mleko v prahu.
- **Priporočimo uživanje več majhnih obrokov in prigrizkov.**
- **Priporočimo uživanje živil in pijače z visoko energijsko in beljakovinsko vrednostjo :** naravni sadni sok, miksan sadje in mleko, jogurti, frape.
- **Priporočimo uporabo prehranskih dodatkov v prahu** (sirotkini proteini, maltodekstin itd.).
- V primeru nezadostnega vnosa mikrohranil, je potrebno razmisliti o uporabi multivitaminskih in mineralnih dopolnil.

# Prehranski načrt

- Potrebe po hranilih
  - Aktivni bolniki 30 -35 kcal/ kg TM / dan
  - Ležeči bolniki 20 – 25 kcal / kg TM / dan
  - *Starostniki 25-28 kcal / kg TM / dan*
- Beljakovine
  - 1 -1,5 g / kg TM / dan
  - Starostnik  $\geq 1,5$ g / kg TM / dan
  - **kvaliteta AA (LEUCIN!)**
- Vnos maščob  
 $\approx 1,6$  g / kg TM / dan ( $\geq 50$  % dnevnega E vnosa)
- Vnos ogh  
 $\approx 3,7$  g/kg TM/dan ( $\leq 50\%$  dnevnega vnosa)
- Voda  
 $\leq 30$ ml/kg TM/dan
- Natrij  
 $\leq 1$  mEq/kg TM/dan



# ENERGIJA

	<b>Moški</b>	<b>Ženske</b>
Energija kcal/dan	65 let 32 kcal/kg > 65 let - 30 kcal/kg	65 let 32 kcal/kg > 65 let-30 kcal/kg

# Sladkorji in prehranske vlaknine

Skupni sladkorji % skupne energije	Enostavni sladkorji	Prehranske vlaknine
45-60%	< 15 %	12.6-16.6 g /1000 kcal ali vsaj 25 g/day
<b>Hranilni viri z nizkim glikemičnim indeksom</b>	Vsebujejo sladkorje iz sadja, mleka in komercialnih izdelkov  Omejiti je potrebno visok vnos fruktoze ali koruznega sirupa	

# BELJAKOVINE

- Na potrebo po beljakovinah vpliva mnogo dejavnikov !
- Ključna je kakovost in količina vnešenih beljakovin.
- Kakovost beljakovin v hrani?
- Kje jih najdemo?
- Kakšna količina na obrok?
- Kaj pazimo pri vegetarijanskih virih živil?

# PROT-AGE, priporoča naslednji vnos beljakovin za zdrave starostnike:

- Povprečen dnevni vnos 1.0 do 1.2 g/kg telesno maso/dan;
- Vnos beljakovin na obrok 25-30 g, vsebujejo naj 2.5 -2.8 g aminokisline levcin;
- Vnos beljakovin enakomerno porazdelimo v tri glavne obroke čez dan in na ta način zagotovimo zadostno preskrbo aminokislin za izgradnjo beljakovin v telesu.

*Bauer, Evidence-Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People: A Position Paper From the PROT-AGE Study Group, JAMDA 2013*

# Maščobe

Vnos maščob % skupne energije	Nasičene maščobne kisline	Polinenasičene PUFA, n. 6	Polinenasičene PUFA-n3	Mononenasičene	Trans maščobne kisline
20-35%	< 10 % (5-10 %)	4-8%	0.5-2%	preostanek	Tako malo, kot je le možno
	Skupno dolgoverižne maščobne kisline -PUFA : 250 mg/day				

Previdnost pri povišanih maščobah v krvi!

- Povišan holesterolse : nižji vnos nasičenih maščob iz živalskih virov (maslo, smetana, siri, mastno meso) in iz hidrogeniranih rastlinskih maščob (margarina, palmovo olje).
- Pri višjih vrednosti trigliceridov v krvi je potrebno omejiti skupen energetski vnos in vnos enostavnih sladkorjev

# Vitamini in minerali

- Pri zdravih, ki se normalno prehranjujejo ni posebnih povečanih potreb po dodajanju vitaminov ali mineralov.
- Izjema je dodajanje **vitamina D**, pri znižanem nivoju v krvi, ker naj bi negativno vplival na zdravje kosti in srčnožilnega sistema, delovanje mišic. Priporočen dodaten vnos je pri 15 mikrog v starosti med 60-74 let in 20 mikrog pri > 75 let.
- Poleg zadostnega vnosa vitamina D je za vzdrževanje propadanja kostne mase potreben tudi zadosten vnos **kalcija**: 1200-1500 mg/d.

# Dehidracija

- Dehidracija JE pogost problem.
- Dehidracija zmanjšuje funkcionalno zmogljivost in vodi do motenj pozornosti, umskega pešanja, vse do zmedenosti.
- Nekateri strostniki namerno zauživajo manj tekočine zaradi težav z inkotinenco!
- Priporočen je vnos 1600ml (8 kozarcev po 2dcl) oziroma 30ml/kg telesne mase na dan.
- **Telesna aktivnost : tekočina, sol**

# Prehransko svetovanje in OPD

- OPD potrebujejo bolniki z **visokim tveganjem** za prehransko ogroženost in s tem za podhranjenost.
- OPD so opredeljeni kot **živila za posebne zdravstvene namene**, ki se lahko predpisujejo na recept.
- OPD se praviloma uporabljajo kot **dodatek k običajni prehrani**, ko samo osnovna prehrana ne zadosti dnevnim prehranskim potrebam.

# Praktična izhodišča za predpisovanje OPD


- ŽIVILA ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE - <http://www.cbz.si/zzs>
- Na podlagi **Priporočil za prehransko obravnavo bolnikov.**
- **Zdravnik specialist ustreznih kliničnih stroke** na osnovi strokovne prehranske obravnave ugotovi, da bolnik potrebuje dodaten enteralen vnos hrani zaradi beljakovinsko energijske podhranjenosti ali kaheksije, ker vnosa energije in posameznih hrani ni mogoče zagotoviti z normalno prehrano.
- Po treh mesecih od uvedbe enteralne prehrane je potrebno opraviti ponovno prehransko obravnavo pri specialistu ustreznih kliničnih stroke.
- **Osebni zdravnik** lahko predpisuje OPD na recept na podlagi izvida specialista ustreznih kliničnih stroke, pediatra ustreznih specialnosti, ali pooblaščenega psihiatra za obdobje, navedeno v izvidu
- Po osnovnem testu preferenc in skladnosti z ugotovljenimi potrebami, bolniku ponudimo 2 OPD na dan za 1-3 mes.

# Meritev sestave telesa - Zakaj?


- **Skupna masa in delež puste in maščobne mase, ki so znotraj ugotovljenih mej** preprečujejo številne zdravstvene probleme, ki so povezani z pretiranim ali prenizkim deležem telesnega maščevja.
- ***Teža maščevja in teža (količina) pustih tkiv, NE skupna teža določajo zdravstveno tveganje (debelost, sarkopenija).***

## Merimo maso

## Merimo moč, funkcijo



# BIA (bioelektrična impendanca)



# **Bioelektrična impedanca (BIA)**

**Ne-invazivna, hitra metoda meritve sestave in funkcije telesa.**

- Nizek tok potuje skozi telo.
- **Osnovni princip delovanja** - mišično tkivo zaradi večje vsebnosti vode oziroma elektrolitov večjo prevodnost v primerjavi z maščobnim tkivom.
- **Na podlagi meritev upornosti različnih tkiv, ki vsebujejo različno količino vode** določi delež mišic, puste mišične mase, delež maščob, delež telesne vode, itd.
- **Indeks puste telesne mase (FFMI).**  
moški < 14,6 kg/m<sup>2</sup>  
ženske < 11,4 kg/m<sup>2</sup>
- **Fazni kot** dober indikator stanja telesnih tkiv (celične mase) in integritete ter funkcije celične membrane.  
**Vrednost** = od 3° and 12°  
**visok** – intaktna celična membrana (visoka celična masa)  
**nizek** – indikator propadanja celične membrane in nezmožnost celic da bi skladiščile energijo.

# Nadaljevanje: primer iz prakse

- *Ocena bolničine prehranske ogroženosti*
- **MUST je 4**
- **Dg:**
- Ne-vnetna bolezenska podhranjenost
- Obravnava pri dietetiku
- REZULTAT obravnave



**PRIPOROČILA**

**PREHRANSKA OBRAVNAVA**

**PRI IZVAJANJU PREHRANSKE PODPORE UPOŠTEVAMO  
OSNOVNA PRIPOROČILA ZA PREHRANO KRONIČNIH BOLNIKOV**

# Praksa

- Ohranjanje/ izgradnja mm pri kroničnih bolnikih
- 
- ✓ Energija + beljakovine
  - ✓ Beljakovine = 1,5g/kg tt (leucin)
  - ✓ Telesna vadba (vadba moči!)

# Zaključek

1. Preprečujemo **podhranjenost** bolnikov, ki močno pospeši **kahektične procese** in poslabša kvaliteto življenja.
2. Poskušamo čim dlje ohranjati **funkcionalno (mišično) maso** in s tem bolnikovo kondicijo in kvaliteto življenja.
3. Prehranska podpora kroničnega bolnika je **del multimodalnega podpornega zdravljenja**
  - Obravnava debelosti pri bolnikih zahteva razumevanje kahektičnih presnovnih procesov
  - Nekritično hujšanje debelih bolnikov vodi v podhranjenost in pospešuje razvoj sarkopenije, sarkopenične debelosti..... kaheksije)
  - Praksa hujšanja bolnikov : klinično škodljiva?
  - Podhranjeni bolniki so dragi bolniki!
  - Zdravstvena dobrobit nekaj več kilogramov v starosti !!

# HVALA ZA POZORNOST!

